

NOTE NATIONALE MILDIOU de la VIGNE 2010

Groupes chimiques	Délai entre traitements (1)		Observations
	Risques faibles à moyens	Risques élevés à exceptionnels	
Spécialités à base de fongicides de surface (ou de contact)			
1	captane, folpel, mancozèbe, manèbe, métirame-zinc, propinèbe, sels de cuivre	maximum 10 jours à adapter selon la pluviosité et la croissance de la vigne	Réduire, si nécessaire, l'intervalle entre traitements en période de croissance active de la végétation ou en cas de lessivage (20 - 25 mm d'eau). Ces matières actives à mode d'action "multi-sites" ne sont pas concernées par les phénomènes de résistance.
Spécialités à base de cymoxanil			
2	cymoxanil + fongicide(s) de surface	10-12 jours	10 maxi si risques élevés 6-8 jours si risques exceptionnels
Spécialités à base de zoxamide			
3	zoxamide + fongicide de surface	10-12 jours	10 jours maxi
Spécialités à base de CAA			
4	diméthomorphe, iprovalicarbe, benthialicarbe, mandipropamid ou valifénalate + fongicide de surface	10 à 14 jours en fonction de la spécialité et du stade de la vigne	10 jours maxi
Spécialités à base de Qol			
5	azoxystrobine, famoxadone ou pyraclostrobine + fongicide de surface (+ <i>cymoxanil</i>) ----- fénamidone + <i>fosétyl AI</i>	Retenir le délai de la (ou des) substance(s) active(s) associée(s)	La présence généralisée et persistante de la résistance rend sans intérêt l'emploi des substances actives de cette famille dans la lutte contre le mildiou. Dans ce contexte, l'efficacité anti-mildiou des spécialités à base de Qol est souvent exclusivement liée à la nature et à la dose du (ou des) partenaire(s) associé(s).
Spécialités à base de Qil			
6	cyazofamide + <i>di-sodium phosphonate</i>	14 jours (préconisations firme)	Aucune résistance connue à ce jour. La notification d'autorisation de mise sur le marché indique une limitation à 3 applications maximum par an. De préférence, ne pas les appliquer consécutivement.
Spécialités à base de phosphonates			
7	fosétyl AI + fongicide de surface (+ <i>cymoxanil</i>)	14 jours	10-(12) jours
Spécialités à base d'anilides			
8	bénalaxyl, bénalaxyl-M ou méfénoxam + fongicide de surface	10-14 jours	10-(12) jours

(1) Les délais entre traitements mentionnés sont indicatifs. Il convient de tenir compte des mentions figurant sur l'étiquette et d'adapter le rythme des applications en fonction des conditions et prévisions météorologiques ainsi que des risques mildiou à partir notamment des informations diffusées par les Bulletins de Santé du Végétal et les bulletins techniques des organisations professionnelles.

(2) Selon la spécialité, la pluviosité et la croissance de la vigne.